

**ANEXO 1.**

Información recopilada por la autora de seis de los ocho caninos de terapia asistida intrahospitalaria que participaron en este protocolo proporcionados por cada uno de sus guías o tutores. (Magia y Mantra el guía no proporcionó la información).

TUTOR	MASCOTA	VACUNACION	ULTIMA VACUNACION	DESPARASITACION	ULTIMA DESPARASITACION	ENTERO/CASTRADO/ESTERILIZ ADO	ALIMENTACION	BAÑO/PELUQUERIA	HIGIENE BUCAL	LIMPIEZA OREJAS	ULTIMA VISITA AL MV
Juliana	Konan	Al día	DA2PPvL + RABIA + Células (antígeno) de Bordetella bronchiseptica 3 x 108, cepa 78-9159, en 1 ml.	Externa: Al día no se sabe el producto interna: Galgocal albenidazol 200mg/Praziquantel 30mg	Interna: 22/06/2023 Externa: Mayo 2023	No	Chunky combinado con pollo, carne, hígados cocinados - wow can	Cada 6 meses con champú a base de clorhexidina	Limpieza 1 vez por semana crema dental para perros a base de clorhexidina	Diaria con pañitos húmedos para perros o con una toalla húmeda de uso exclusivo	Hace mes y medio (junio) presente episodios de vómito y diarrea se le realizó tratamiento
Diana	Kika	Vencida	Hace un año	Interna: Total FLC Fenbendazol + prantel Externa: Hace 4 años	Interna: 14/12/2022 Externa: hace 4 años	Esterilizada desde los 2 años	Hill's Senior	Mensuales piloskin (sarna) recomendación del dermatólogo	Ninguna Se les administra mensual hueso de vaca curado durante 4 días	Ninguna Ninguna se lamen entre sí las orejas	Febrero de 2023 control de Ehrlichia
Diana	Kana	Vencida	Hace un año	Interna: Total FLC Fenbendazol + prantel Externa: Hace 4 años	Interna: 14/12/2022 Externa: hace 4 años	Esterilizada desde los 2 años	Hill's Senior	Mensuales piloskin (sarna) recomendación del dermatólogo	Ninguna Se les administra mensual hueso de vaca curado durante 4 días	Ninguna Ninguna se lamen entre sí las orejas	
Mauricio	Magia										
Mauricio	Mantra										
Esperanza	Bengie	Vencida	Rabia 20/05/2023	Interna: Total FLC Fenbendazol + prantel Externa: Brevecto Furalaner	Interna: 20/05/2023 Externa: Abril de 2023	Castrado.	Max light. Cada quince días se le prepara arroz con vegetales (brocoli, apio, zanahoria) con pollo, mollejas, corazones y pechuga cocinada sin sal ni condimentos. Toma glucosamina, Ginkgo biloba y omegas.	Se lleva al spa cada tres meses. Se limpia con agua y champú cada quince días.	Cada ocho días con desmanchador dental y crema dental para perros con clorhexidina. Se le han realizado 3 profilaxis 2 bajo anestesia y 1 sin anestesia	Se le limpian las orejas con pañitos húmedos, baxidin y orenda.	Enero de 2023 por control
Angela	Sky	Al día	Pentavalente + rabia	Neogard Spectra afoxolaner y milbemicina oxima	Interna: 05/03/23 Externa: 01/08/23	Esterilizada en 2016	Kirkland Signature concentrado, zanahorias frescas, banana y patas deshidratadas de pollo sin sal (colageno) para las articulaciones. Toma glucosamina y condroitina, se le administra traumeel 3 tabletas al día y previcox por 10 días para soporte articular.	Se baña cada vez con jabón de coco, shampoo can amor árbol de te y shampoo.	Se le hace una mezcla con crema dental para perros, zumo de limón, bicarbonato y agua oxigenada cada seis meses. Para la gingivitis se le limpian los dientes con una gasa impregnada de agua oxigenada y enjuague bucal de menta fresca en spray y para el sarro fresh breath en gel cuando la van a llevar a las terapias y cada miércoles se le da a roer un hueso natural.	Se le limpian las orejas cada vez que secude la cabeza con cerulíne (solución otica) y con una gasa impregnada de agua oxigenada cada 15 días.	Hace un año le dio hipoglucemia se le maneja con dieta, y se le realizaron radiografías y se le diagnosticó displasia de cadera. El domingo 30 de Julio de 2023 la fue a ver el Médico Veterinario porque presentaba mucho dolor articular se le realizaron exámenes de sangre y orina aun no han salido los resultados.
Sandra	Bella	Al día	Hexavalente DHPPI-RL+ KC Células (antígeno) de Bordetella bronchiseptica 3 x 108, cepa 78-9159, en 1 ml.	Interna: Total FLC Fenbendazol + prantel Externa: Simparica Sarolaner	Interna: 15/05/23 Externa: 31/07/23	Esterilizada	Taste of the Wild combinado con comida natural sin sal, cebolla, ajo, no condimentos, ni azúcar. No se le administra ningún suplemento.	Se baña cada dos meses.	Profilaxis cada año se limpia con crema dental para perros y pañitos.	Limpieza de orejas con cada baño.	Julio 29 control anual y vacunación


## ANEXO 2.

Se consiguan la categorización de biológicos a aplicar durante el esquema de vacunación en caninos. Tomado y adaptado de: M. J. Day et al., 2016.

<p><b>Distemper + Parvovirus (DP)</b></p> <p>Vacuna viva combinada para la inmunización activa de cachorros jóvenes contra el parvovirus canino y el virus del moquillo canino.</p> <p>Dosis/vía de administración: Deberá inyectarse por vía SC.</p>	<p>Vacuna combinada e inactivada para la inmunización activa de perros contra Leptospira interrogans serovares Canicola e Icterohaemorrhagiae y rabia.</p> <p><b>Dosis/vía de administración:</b> Deberá inyectarse por vía SC. La edad ideal para iniciar el plan vacunal contra Leptospira es a partir de la octava semana de edad y deben aplicarse al menos dos dosis con un intervalo aproximado de 2 a 4 semanas.</p>
<p><b>DHPPI</b></p> <p>Vacuna combinada de virus vivo para la prevención del moquillo, la hepatitis infecciosa, el parvovirus y la parainfluenza en caninos.</p> <p>Dosis/vía de administración: Deberá inyectarse por vía SC. Inmunización activa de perros contra el moquillo canino, la hepatitis infecciosa canina producida por Adenovirus canino tipo 1, infecciones producidas por Adenovirus canino tipo 2, parvovirus canina y parainfluenza canina.</p>	<p>Vacuna viva liofilizada para la inmunización de perros sanos contra el virus de la parvovirus canina.</p> <p><b>Dosis/vía de administración:</b> Deberá inyectarse por vía SC o IM. Repetir la vacunación a intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el cachorro cumpla las 12 semanas. Se recomienda la revacunación anual con una dosis.</p>
<p><b>Leptospira interrogans, serovar icterohaemorrhagiae cepa 820 K inactivada, Leptospira interrogans, canicola Cepa Ca-12-000 inactivada.</b></p> <p>En caninos para la protección contra la leptospirosis (enfermedad zoonótica) causada por Leptospira interrogans serovares icterohaemorrhagiae y canicola.</p> <p>Dosis/vía de administración: Deberá inyectarse por vía SC. Unidosis vía útil de 24 meses</p>	<p>Vacuna combinada para la inmunización de perros sanos contra moquillo, hepatitis, parainfluenza, parvovirus y leptospirosis.</p> <p><b>Dosis/vía de administración:</b> Deberá inyectarse por vía SC o IM.</p>
<p><b>DAPPV-L4</b></p> <p>Vacuna combinada para la vacunación de animales sanos para prevenir la enfermedad causada por el virus del Moquillo canino, Adenovirus canino tipo2 (hepatitis), virus de la parainfluenza canina y parvovirus canino. Como ayuda en la prevención de la enfermedad y mortalidad causadas por Leptospira interrogans serovares canicola, icterohaemorrhagiae, Pomona y Grippopythosa.</p> <p>Dosis/vía de administración: Deberá inyectarse por vía SC. Administrar 1ml vía SC a partir de las 8 semanas de edad y repetir a intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el perro tenga 12 semanas de edad. Se recomienda revacunación anual con una dosis.</p>	<p>Vacuna inactivada para la inmunización contra la rabia en perros, gatos, bovinos, ovinos y equinos sanos. Transcurridas 3 semanas después de la vacunación se alcanzan los niveles máximos de anticuerpos.</p> <p><b>Dosis/vía de administración:</b> Deberá inyectarse por vía SC. Primera vacunación a partir de los 3 meses. Revacunación anual.</p>
<p><b>DA2PPV-L+CV</b></p> <p>En perros sanos para la prevención de las enfermedades causadas por el virus del moquillo canino, Adenovirus tipo 2, parainfluenza canina, parvovirus canino, Leptospira Canicola, Leptospira icterohaemorrhagiae y Coronavírus.</p> <p>Dosis/vía de administración: Deberá inyectarse por vía SC o IM.</p>	<p>Vacuna viva combinada para desarrollar la inmunidad activa contra la tos de las perreras provocada por Bordetella Bronchiseptica y el virus de la parainfluenza canina.</p> <p><b>Dosis/vía de administración:</b> Aplicación intranasal. Rápida Acción inmunidad por un año. La vacuna se puede aplicar desde las dos semanas de edad. Administrar 0.4ml en un orificio nasal. En caso de alta exposición y antecedentes del criadero, se puede aplicar una dosis 72 horas antes del periodo de riesgo. Revacunar anualmente.</p>


**ANEXO 3.**

Esquema de vacunación y desparasitación en cachorros desde las primeras 4 semanas hasta los 4 meses de edad sugeridos por la autora basado en recopilación y adaptación de la literatura consultada. Tomado y adaptado de: M. J. Day et al., 2016.



### ANEXO 4.

Como aporte al proceso se crea y anexa un diagrama de flujo para orientar el proceso del examen semiológico completo por parte del Médico Veterinario. Elaborado y adaptado: Castaño, 2023. Fuente: Breyov, 2014



## ANEXO 5.

Se consigna formato de historia clínica diseñado y elaborado por la autora para que sea diligenciado por el Médico Veterinario a cargo.

**FORMATO DE HISTORIA CLINICA PARA CANINOS DE TERAPIA ASISTIDA INTRAHOSPITALARIA DE LA CRUZ ROJA SECCIONALES BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA**




  

<b>Fecha</b>	
<b>Médico Veterinario tratante</b>	
<b>ID mascota</b>	

<b>Propietario Documento</b>	
<b>Dirección:</b>	
<b>ID historia:</b>	
<b>Paciente:</b>	
<b>Especie:</b>	
<b>Antecedentes:</b>	





<p>¿Vacunas? SI_ NO_ ¿Cuáles?</p>	<p>¿Desparasitación? INTERNA SI_ NO_ ¿Hace cuánto? ¿Con que productos?</p> <p>EXTERNA SI_ NO_ ¿Hace cuánto? ¿Con que productos?</p>
<p><b>Dieta:</b></p> <p>Bebe agua con normalidad SI_ NO_</p>	<p><b>Amnésicos:</b> El canino ha estado expuesto recientemente a enfermedades infectocontagiosas: SI_ NO_ ¿Cuáles?</p> <p><b>Tiene usted conocimiento si su mascota ha presentado alguna reacción adversa a algún medicamento o vacuna SI_ NO_ ¿Cuáles?</b></p>
<p><b>Temperatura:</b></p> <p><b>Mucosas:</b></p> <p><b>PR:</b></p> <p><b>RDH/:</b></p> <p><b>Re:</b></p> <p><b>ACTIVIDAD:</b></p> <p><b>MOTIVO DE CONSULTA:</b></p>	<p><b>Condición corporal:</b></p> <p><b>FC:</b></p> <p><b>RXDR/:</b></p> <p><b>Actitud:</b></p>


  

<b>EVALUACION DE SISTEMAS:</b>	
Sistema afectado:	Sistema genitourinario:
Sistema respiratorio:	Sistema cardiovascular:
Sistema digestivo:	Sistema reproductivo:
Sistema musculoesquelético:	Sistema nervioso:
Organos de los sentidos:	Ojos/oidos:
Piel y anexos:	Observaciones:
Exámenes complementarios:	Tratamiento inicial:
	Firma:
	Nombre comercial:
	Vía:
	Dosis:
	Tiempo:
	Recomendaciones:
<b>Diagnósticos diferenciales:</b>	
<b>Lista de problemas:</b>	
<b>Diagnostico definitivo:</b>	
<b>Fecha próxima consulta:</b>	<b>Firma MV #TP</b>




## ANEXO 7.

Como aporte al proceso se crea y anexa un diagrama de flujo acerca del Tratamiento de los principales ectoparásitos que afectan a los caninos. Tomado y adaptado: TroCCAP, 2022 y ESSCAP, 2016.



### ANEXO 8.

Como aporte al proceso se crea y anexa un diagrama de flujo acerca de los requerimientos para clasificar según protocolo general de salud en caninos de Terapia Asistida Intrahospitalaria. Fuente: Castaño y Moreno, 2023



## ANEXO 9.

Como aporte al proceso se crea y anexa un diagrama de flujo acerca de los requerimientos de pre -selección en caninos de Terapia Asistida Intrahospitalaria. Fuente: Castaño y Moreno, 2023

